AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-5-66 501405

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL CORREZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DOME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier, CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

ABONNEMENT ANNUEL 15 F

Supplément n° 2 au Bulletin n° 67 d'AVRIL 1966.-

A V E R T I S S E M E N T S.-

V I G N E

BLACK-ROT.-

Les germes susceptibles de provoquer les premières contaminations sont arrivés à maturité.

Dans les vignes intéressées par cette maladie et ayant atteint ou dépassé le stade D (voir, au verso, le tableau des stades-repères), effectuer un traitement qui sera renouvelé après une dizaine de jours.

Pour les produits à utiliser se reporter à la liste précédemment transmise. Il est inutile d'effectuer ces traitements dans les vignes qui, non atteintes l'an dernier, ne se trouvent pas à proximité de parcelles incultes.

POIRIERS - POMMIERS

TAVELURES.-

Là où les dernières pluies ont été abondantes, il y a lieu de renouveler la protection.

Dans les vergers où le traitement conseillé dans notre dernier bulletin n'a pas encore été effectué, intervenir dans les meilleurs délais.

I N F O R M A T I O N.-

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DE L'ASPERGE.-

Dans les aspergeraies non encore en production, effectuer, par beau temps, un premier traitement (attendre, s'il y a lieu, que les premiers turions sortent du sol).

Pour les produits à utiliser se reporter à la liste précédemment transmise.

CLERMONT-FERRAND, le 25 Avril 1966.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :


P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND
Directeur-Gérant : L. BOUYX.


P 142

Tirage n° 597 du 25 Avril 1966 - ABONNEMENT 1966 - 2 200 exemplaires - Expédition n° 7.


Stades repères de la vigne



A Bourgeon d'hiver — B Bourgeon dans le coton — C Pointe verte — D Sortie des feuilles



E Feuilles étalées — F Grappes visibles — G Grappes séparées



H Boutons floraux séparés — I Floraison — J Nouaison